

poměrů v pánvi , zejména v retroperitoneu. Upozorňuje i na relativně častý výskyt cévních anomálií, které musí operatér rozpoznat a které mohou plánovaný operační postup komplikovat.

V poslední části této kapitoly se pak zabývá problematikou lymfedémů a lymfocyst, které jsou po radikálních onkogynekologických operacích relativně časté.

Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce

1. Je stanovení HE4 resp. mikro RNA natolik spolehlivé aby rozlišilo maligní od benigních lézí endometria a nahradilo tak doposud standardní postupy ? Např. HSK+ biopsii u susp. UZ nálezů žen v menopauze ?
2. Do jaké míry mohou některé nové možnosti dosažení těhotenství (např. transplantace dělohy, kryokonzervace ovarii) ovlivnit plánovanou radikalitu operací pro gynekologické malignomy ?

...

Závěr

Habilitační práce MUDr. Luboše Mináře, Ph.D., „Analýza vybraných charakteristik týkajících se diagnózy, prognózy a radikální operační léčby gynekologických malignit“ **splňuje** požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru Gynekologie a porodnictví.

Brno dne 25.2.2019.

Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc

.....
podpis